

!"#\$%&'()*(湖泊科学), 2020, !" (2): 496-505

DOI 10.18307/2020.0218

© 2020 by !*+, -\$. */#\$%&'()&-(

鄱阳湖湿地豆雁(*Anser fabalis*)越冬种群的春季迁徙路线及其活动特征^{*}

曹开强¹, 李言阔^{1**}, 王 强^{2**}, 周学红³, 钟毅峰¹, 缪沪君⁴

(1: 江西师范大学生命科学学院, 南昌 330022)

(2: 中国科学院东北地理与农业生态研究所, 中国科学院湿地生态与环境重点实验室, 长春 130102)

(3: 东北林业大学野生动物资源学院, 哈尔滨 150040)

(4: 江西省林业科学院, 南昌 330032)

摘

stopped for a significant longer time (12.7 ± 7.2 days) between 40° – 50° N latitude. Northeast China Plain and the eastern Inner Mongolia plateau are important stopover sites for them. Bean goose is a diurnal animal; its activity level in day is significantly higher than that at night. In the pre-migration period, the activity peaks at 8:00–9:00 and 18:00–19:00, while the activity peaks occurred in 7:00–8:00 and 18:00–19:00 during migration. There was significant variation of average migration distance in different environment temperatures ($F = 8827, df = 9, P = 0.000$), and its maximum migration distance (4.9 ± 14.4 km/h) occurred in 0 – 5°C .

Keywords: Lake Poyang; migration route; activity level; Bean goose

豆雁(*Anser fabae*)属雁形目(Anseriformes)鸭科(Anatidae)雁属,是一种大型迁徙水鸟^[1]。长江中下游是豆雁的重要越冬地,近年来鄱阳湖豆雁越冬种群显著增加,2004年冬季记录到5200只个体^[2],2007年该区越冬种群数量达13000余只^[3],2009年统计数量达28000余只^[4]。鄱阳湖湿地分布有较大的豆雁越冬种群,但有关鄱阳湖湿地豆雁的研究报道极少,主要涉及其种群数量和分布,种群生态学基础研究相对缺乏。

候鸟迁徙行为是鸟类生态学中一个重要的研究领域,国内外学者开展了大量的研究^[5-8]。目前有关豆雁迁徙行为的研究鲜见报道,研究技术落后是造成这种局面的关键原因之一。近年来,由于卫星跟踪技术具有跟踪范围广、定位精度高、工作时间长等优点,在研究鸟类迁徙方面得到了广泛推广,尤其是国产卫星跟踪设备的成功研发和推广,降低了该技术的使用成本,为研究鸟类迁徙行为提供了有力的技术支撑。为了揭示鄱阳湖湿地越冬豆雁的迁徙路线和活动特征,我们在鄱阳湖湿地采用国产卫星跟踪技术对豆雁迁徙路线及其活动规律进行了研究,主要分析了:(1)豆雁的迁徙路线;(2)豆雁迁徙前期和迁徙过程中活动量的变化;(3)豆雁迁徙过程中的日活动距离;(4)迁徙期间昼夜活动距离的变化,以及温度对豆雁活动的影响。

1 研究方法

1.1 研究区域

鄱阳湖($28^\circ 11' \sim 29^\circ 51' \text{N}$, $115^\circ 49' \sim 116^\circ 46' \text{E}$)位于江西省北部,是中国第一大淡水湖,上承赣江、抚河、信江、饶河、修水五大河流,下与长江相通。本研究跟踪的20只豆雁分别来自鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区和都昌候鸟省级保护区(图1)。鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区位于鄱阳湖主湖区南部,是赣江中支和南支汇入鄱阳湖开放区域形成的内陆河湖型三角洲湿地。都昌候鸟省级自然保护区位于江西省北部,长江南岸,鄱阳湖北岸,地貌以丘陵和滨湖平原为主,且水域宽阔。两保护区均处于东亚—澳大利亚水鸟迁飞线路,是重要的水鸟越冬地和中继站。

1.2 方法

本研究利用国产卫星跟踪设备对20只豆雁健康个体进行了卫星跟踪定位,豆雁主要来自都昌候鸟省级自然保护区和鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区,卫星跟踪器分为背负式和颈环式(表1)。卫星跟踪器安装时间分别为2019年2月26日、3月5日和3月12日。跟踪器为湖南信士科技有限公司生产,背负式重量为24 g,颈环式为35 g,均在豆雁体重(平均3.0 kg)的4%以下^[9]。卫星跟踪器采用GPS定位,精度分为A(± 5 m)、B(± 10 m)、C(± 20 m)、D(± 100 m)和无效(无法定位)5类定位等级,对卫星数据分析时,A~D级数据可用于豆雁的迁徙研究的数据统计。数据内容包括活动量、温度、经度、纬度、速度、采集时间等10个字段,各个字段的数据一一对应,其中活动量为设备在一个采集周期内(1小时)所运动的次数。温度为设备在采集时间记录的温度值($^\circ\text{C}$)。佩戴在豆雁颈部的颈环式跟踪器由于没有羽毛覆盖,记录到的温度值与环境温度值一致。本文在探究温度对活动距离的影响时,对相邻两个采集时间点上的温度值取算术平均数,作为这段时间内的迁徙温度。根据在线(<http://richurimo.51240.com>)查询的2—5月天亮及天黑的时间,选取每个月天亮及天黑时间的中值作为该月日间和夜间的划分依据^[10]。根据迁徙状态,将豆雁自释放开始至迁飞离江西省定义为迁徙前期,北迁离开江西省为迁徙期。采用迁徙的日期变化分析法来确定迁徙状态改变的“日期阈值”^[11],即某一时刻经度、纬度及活动距离发生明显变化,为迁徙状态变化的临界点。由于迁徙期间经纬度变化较大,根据迁徙状态将迁徙期划分为飞行状态和停歇状态。

利用ArcGIS 10.2软件中Tracking Analyst Tools中查询定义停歇状态(“speed” ≤ 10),生成停歇地和迁徙路线图,并筛选出迁徙前后日间和夜间所有的点。在SPSS 20.2软件中,利用独立样本L检验的方法,对迁

动距离之间的相关性.



曹开强等:


编号						
JXNU						
JXNU						
JXNU						
JXNU						
JXNU						
JXNU						
JXNU						
MTT035	背负	2019-02-26	3.4	都昌保护区	捕捉	工作中
MTT046	背负	2019-02-26	2.9	都昌保护区	捕捉	异常
MTT072	背负	2019-02-26	2.9	都昌保护区	捕捉	异常
MTT090	背负	2019-03-12	2.9	都昌保护区	救助	工作中
MTT094	背负	2019-02-26	3.5	都昌保护区	捕捉	异常
MTT098	背负	2019-02-26	3.0	南矶湿地保护区	捕捉	异常

表 2 豆雁卫星跟踪数据概况

Tab.2 List of satellite tracking information of Bean goose

编号	迁徙开始时间	追踪距离/km	追踪时间/d	迁徙距离/km	迁徙时间/d	利用停歇地数
JXNU11	019-03-20 8:00	3038.5	69.3	2892.9	48.4	7
JXNU13	19-03-26 12:01	3080.8	70.4	2840.3	42.4	7
JXNU14	019-04-06 6:00	2036.3	60.9	1660.4	22.1	3
JXNU15	19-03-12 17:00	2406.3	70.4	2344.3	56.2	6
JXNU16	19-04-25 18:00	1588.9	56.4	1303.5	12.2	11
JXNU17	019-04-01 8:00	2809.7	70.4	2572.7	36.6	7
JXNU18	019-03-19 7:02	2789.9	69.6	2685.4	48.8	5
MTT010	019-03-15 6:00	829.0	68.5	706.7	51.8	10
MTT011	019-04-01 3:00	2353.5	70.4	2103.3	36.4	3
MTT013	019-04-06 6:00	1635.2	69.3	1373.0	31.7	7
MTT014	019-03-16 9:00	554.1	70.4	437.1	52.5	9
MTT015	019-04-01 9:00	1384.5	65.9	1166.7	32.1	8
MTT028	019-03-17 8:00	298.0	63.2	133.6	51.6	1
MTT029	—	—	—	—	—	—
MTT035	019-04-06 10:00	468.4	56.9	181.4	30.5	4
MTT046	019-03-11 9:00	143.9	21.4	26.6	8.9	1
MTT072	—	159.6	70.4	—	—	—
MTT090	019-04-25 10:00	837.9	52.8	622.9	8.4	5
MTT094	019-03-12 8:00	443.8	55.7	335.3	41.9	1
MTT098	019-03-11 8:00	1134.4	17.7	905.5	12.0	6

“—”代表数据缺



2.4 停歇地日活动距离

具有完整国内春季迁徙路线的 9 只豆雁纬度跨度在 $28^{\circ}6' \sim 50^{\circ}7'N$ 之间, 我们制作了纬度和时间关系图, 水平线表示停留, 垂直线表示向北迁飞(图 4)。成功迁徙的豆雁从越冬地鄱阳湖($28^{\circ}87' \sim 29^{\circ}19'N$)

相关(,=-0

地名								
鄱阳湖								
怀柔水库								
青龙河								
闪电河								
兴城西								
卧龙岗								
洋沙								
向海								
松花江								
嫩江								
黑龙江								
河	内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗							
嘎泡子	内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗	43°17'18"~43°23'43"	10.8	58.07	23.0			
山水库	内蒙古自治区赤峰市	42°37'48"~42°45'24"	10.4	15.12	43.8	1	440	
哈尔河	内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗	44°26'46"~44°37'3"	12.1	15.38	78.2	2	410	
乌拉盖河	内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗	45°41'3"~46°22'14"	13.8	58.68	65.2	2	910	
额尔格勒河	内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗	49°24'41"~49°38'10"	5.6	83.32	18.5	1	600	
额尔古纳河	内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗	49°51'37"~50°7'44"	12.2	98.18	89.0	1	510	

3 讨论与结论

3.1 卫星跟踪对豆雁的影响

对比两种类型卫星跟踪器的效果来看,颈环式跟踪器具有明显的优势,7只佩戴颈环的豆雁均成功迁徙,并且跟踪器持续工作无异常,而背负式跟踪器13只豆雁中有4只个体出现异常,6只个体成功迁徙,2只个体在迁徙途中停歇地做长时间的停留,1只个体未迁徙仍停留在鄱阳湖.从佩戴方式上考虑,背负式跟踪器由于绑在豆雁背部并且绳子需要绕过双翅可能在一定程度上限制了豆雁的飞行;而且背负式相较于颈环式更加的繁琐需要更长的时间,这样对其造成伤害的可能性也会增加.所以在利用卫星跟踪技术研究雁鸭类时,颈环式跟踪器是更为合适的选择.

本研究中跟踪的20只豆雁,有16只在2月份安装并释放,11只已成功迁徙到内蒙古和东北三省的边境地区,而3月份安装的4只个体,只有1只成功迁徙,3只出现异常.从豆雁迁徙开始时间来看,3月中下旬和4月初为正常的迁徙时间,而在3月12日释放的3只豆雁(JXNU16、MTT035和MTT090),由于受伤被救助的时间较晚,短时间内来不及完成能量储备直至4月下旬才开始迁徙,过晚的迁徙在没有合适迁徙种群的情况下迁徙成功率可能较低.安装卫星跟踪器应选择3月份之前,这样可以减小对豆雁迁徙活动的影响,从而提高卫星跟踪的成功率.

3.2 迁徙路线与停歇地

季节性迁徙可以理解为一种维持繁殖地资源同时避免该地资源季节性枯竭的长期生存策略[12-14].

究发现豆雁在国内的迁徙路线可分为东线和中线两部分,在 $30^{\circ} \sim 40^{\circ} \text{N}$ 之间东线和中线均从鄱阳湖平原出发,经江淮平原、黄淮平原和海河平原,中线最西侧沿着太行山脉以东,东线东侧为山东丘陵和渤海湾。中线和东线在 40°N 左右开始区分,中线迁徙种群进入内蒙古高原东部,东线迁徙种群进入东北平原地区。大兴安岭山脉是这中、东两线的天然屏障。东线经过我国安徽、江苏、山东、辽宁、吉林、黑龙江,进入俄罗斯,与郭家良和 Si 等报道的迁徙路线基本一致^[15-16]。中线经过我国湖北、安徽、河南、河北、内蒙古,进入蒙古,与 Wang 得出的迁徙路线有部分重叠^[17]。张孚允等分析了我国鸟类环志资料后将我国分 3 个主要候鸟迁飞区:东部候鸟迁徙区,包括东北地区、华北东部平原、丘陵和滨海地区;中部候鸟迁徙区,包括内蒙古东部、中部草原,华北西部地区以及陕西地区;西部候鸟迁徙区,包括在内蒙古西部干旱草原,甘肃、青海、宁夏等地的干旱或荒漠、半荒漠草原地带和高原草甸草原地区^[18]。本研究中医雁的迁徙路线在一定程度上支持这一结论。

迁徙性动物依靠迁徙期间成百上千个运动决策实现迁徙以及对时机的把握^[19]。迁徙路线和迁徙策略具有很强的适应性,并且中途停歇地在繁殖地和越冬地之间提供重要的连接^[20]。本研究发现迁徙豆雁对 $30^{\circ} \sim 40^{\circ} \text{N}$ 和 $40^{\circ} \sim 50^{\circ} \text{N}$ 两个纬度区间的利用时间存在显著差异,但是停歇次数差异不显著。这些停歇地可以分为三类:第一类包括湖北、安徽、江苏和山东等长江中下游平原地区与华北平原地区,如龙感湖、升金湖、吉利河或者人工库塘等湿地,是具有随机选择性的临时停歇地,供候鸟临时休息或供候鸟在恶劣气候下进行临时停歇,停歇时间较短^[21];第二类包括北京、天津和河北等华北地区向东北地区 and 内蒙古地区的过渡地带,如怀柔水库、青龙河等湿地,是飞越高山、海洋等生态屏障前的停歇地。候鸟在飞越生态屏障前,常需要在这些地区的高质量停歇地储备大量的能量^[22];第三类包括被大兴安岭分隔开的内蒙古东部地区和东北地区,如锡林郭勒草原、呼伦贝尔草原、辽河平原、松嫩平原和三江平原等地区湿地,是候鸟传统的补给地,候鸟对这些停歇地的忠诚度较高,在此停留时间较长,能够积蓄能量为鸟类继续飞行和繁殖提供保障^[23]。豆雁对临时停歇地选择的随机性,以及对传统补给地高忠诚度形成了迁徙路线前期的分散和后期在重要停歇地的高重复率^[24]。

3.3 迁徙前后的活动量变化

活动量测度是个体在一个采集周期内(一般为 1 h)活动的次数,活动量大表明个体可能与迁飞有关,也可能是个体在停歇地开展大量的觅食或其它活动。豆雁迁徙前期和迁徙期的活动量都具有明显的昼夜变化,白天的活动水平高于夜间,这表明豆雁是昼行性动物,这一习性与其它大多数雁鸭类物种一致^[25]。迁徙前期日间活动高峰为 8:00—9:00 和 17:00—18:00,而迁徙期活动高峰为 7:00—8:00 和 17:00—18:00,迁徙期活动高峰较迁徙前期提前一个小时,可能是因为北半球春分日到夏至日昼渐长夜渐短,纬度越高的地区天亮的时间越早,光照强度达到一定水平豆雁即开始活动^[26-28]。迁徙前期和迁徙期白天活动量都反映出早上和下午较晚时分较高,中午较低,呈现出一个双峰值曲线,这与刘静^[29]观察到的日觅食曲线规律基本一致,

部分水域处于冰冻状态,不利于豆雁栖息而选择飞行寻找合适的栖息地点.

4 参考文献

- [1] Zheng GM ed. A checklist on the classification and distribution of the birds of China: Second edition. Beijing: Science Press, 2011: 19-20. 郎光美. 中国鸟类分类与分布名录: 第2版. 北京: 科学出版社, 2011: 19-20]
- [2] Cao L, Barter M, Lei G & \$. Anatidae in the Yangtze floodplain in winter 2004 and 2005. *Казарка: бюллетень Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии*, 2008, \$(2): 146-160.
- [3] Tu YG, Yu CH, Huang XF & \$. Distribution and population of the overwintering Anatidae waterfowl in Poyang Lake. @(:\$ @4.) (+.:+,\$& E-)C&,0):0 !\$-47)&-0)0, 2009, !(4): 760-764, 771. 涂业苟, 俞长好, 黄晓凤等. 鄱阳湖区域越冬雁鸭类分布与数量. *江西农业大学学报*, 2009, !(4): 760-764, 771]
- [4] Wu JD, Ji WT, Liu GH & \$. Number and distribution of over-wintering waterbirds in Poyang Lake by aerial survey. '*+;5 ?5)-\$ P*,&0:;,'()&-(&, 2010, (1): 23-28. 吴建东, 纪伟涛, 刘观华等. 航空调查越冬水鸟在鄱阳湖的数量与分布. *江西林业科技*, 2010, (1): 23-28]
- [5] Myers JP, Morrison RIG, Antas PZ & \$. Conservation strategy for migratory species. @9&,\$(-'()&-:0:, 1987, *) (1): 18-26.
- [6] Badzinski SS, Kennedy L, Petrie SA & \$. Variation in body composition and digestive organs of tundra swans during migration at long point, Lake Erie, Ontario. A\$&,>),=0: L5& <-&,-\$)*-\$\$. !*+,-\$. */ A\$&,>),= M)*.*4; , 2011, !#(4): 468-475.
- [7] Turcotte Y, Lamarre JF, Bêty J. Staging ecology of Semipalmated Plover (?5\$,\$=,)+0 0&9)8\$.9\$:+0) and Semipalmated Sandpiper (?\$.)=,0 8+0)..\$) juveniles in the St. Lawrence River Estuary during fall migration. ?\$-\$=)\$- !*+,-\$. */ N**.*H 4; , 2013, %\$(11): 802-809.
- [8] Polakowski M, Kasprzykowski Z. Differences in the use of foraging grounds by Greylag Goose @-0&, \$-0&, and White-fronted Goose @-0&, \$,>)/,*-0 at a spring stopover site. @C)\$- M)*.*4; 1&0&\$,(5, 2016, %(4): 265-272.
- [9] Barron DG, Brawn JD, Weatherhead PJ. Meta-analysis of transmitter effects on avian behaviour and ecology. J&:5*=0)- 6H (*.*4; S 6C*+.)*- , 2010, \$(2): 3-5.
- [10] Meng WY, Li SH, Zhou JY & \$. Studies on the movement, home range, and habitat use of greylag geese (@-0&, \$-0&,) based on satellite tracking. @(:\$ 6(*.*4)(\$ ')-)(\$, 2018, !((16): 5659-5666. 孟维悦, 李淑红, 周景英等. 基于卫星跟踪的灰雁秋季活动特征与生境利用研究. *生态学报*, 2018, !((16): 5659-5666]
- [11] Chen W, Doko T, Fujita G & \$. Migration of tundra swans (?;4-+0 (*+9>)\$-+0) wintering in Japan using satellite tracking: identification of the eastern Palearctic flyway. N**.*4)(\$. '()&-(&, 2016, !!(1): 63-72.
- [12] Bell CP. Process in the evolution of bird migration and pattern in avian ecogeography. !*+,-\$. */ @C)\$- M)*.*4; , 2000, !\$: 258-265.
- [13] Alerstam T, Hedenstrom A, Akesson S. Long-distance migration: Evolution and determinants. G)%*0, 2003, \$'!(2): 247-260.
- [14] Cresswell K, Satterthwaite W, Sword G. Understanding the evolution of migration through empirical examples. In: Milner-Gulland E, Fryxell J, Sinclair A eds. *Animal migration: A synthesis*. Oxford: Oxford University Press, 2011: 7-16.
- [15] Guo JL, Liu XH, Yang P & \$. Spring migration route and stopovers of bean goose (

- [20] Webster MS, Marra PP, Haig SM & S. Links between worlds: unraveling migratory connectivity. *Science*, 2002, 295(5564): 76-83.
- [21] Warnock N. Stopping vs. staging: the difference between a hop and a jump. *Journal of Ornithology*, 2010, 151(6): 621-626.
- [22] See